

روشهای مختلف جراحی برای ترمیم فتق اینگوینال وجود دارد. یکی از روش های خیلی خوب با عارضه کم روش ترمیم فتق اینگوینال به روش تعبیه مش پره پریتونال می باشد که از نظر عوارض بعد از عمل جراحی و میزان عود به خوبی روش اثبات شده لیختن اشتاین می باشد. ترمیم فتق اینگوینال از پایه های جراحی عمومی بوده و از شایعترین اعمال جراحی مورد کاربرد در دنیا به شمار می رود که این امر به دلیل بروز بالای آن در طول زندگی و تنوع مداخله های درمانی موفق نسبت داده می شود.

## هدف:

بررسی مقایسه ای هرنیورافی اینگوینال باز به روش ترمیم پره پریتونال با روش ترمیم لیختن اشتاین از نظر عوارض و عود بعد از عمل جراحی می باشد.

**مواد و روش کار:** در این کار آزمایی بالینی ۲۴۰ بیمار با جراحی هرنی اینگوینال انتخاب شدند که در یک گروه ۱۴۰ مورد هرنیورافی به روش لیختن اشتاین بود و ۱۰۰ مورد به روش باز پر پریتونال ترمیم شد و اطلاعات هر کدام از بیماران شامل سن، جنس، نوع جراحی انتخاب شده و عوارض بعد از عمل و عود بعد از عمل ثبت شد. به کلیه بیماران طبق اظهارنامه ضمیمه شده اطلاعات لازم در مورد هر کدام از دو روش جراحی داده شد؛ سپس بیماران در هر گروه با یکدیگر مقایسه شدند و وارد مطالعات آماری گردید.